



ワクチン名		接種済み	0歳	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	1歳1か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳
不活化ワクチン	B型肝炎 (母子感染予防を除く)	定期			①	②						③																
不活化ワクチン	ヒブ	定期			①	②	③								④													
不活化ワクチン	小児用肺炎球菌	定期			①	②	③								④													
不活化ワクチン	四種混合 (DPT-IPV)	定期			①	②	③								④													
生ワクチン	MR (麻しん風しん混合)	定期													①													
生ワクチン	水痘 (みずぼうそう)	定期													①													
不活化ワクチン	日本脳炎	定期																										
生ワクチン	ロタウイルス	任意			①	②																						
		任意					③																					
生ワクチン	おたふくかぜ	任意													①													
不活化ワクチン	インフルエンザ	任意																										

定期 定められた期間内で受ける場合は原則として無料(公費負担)。 定期予防接種の対象年齢 ↔○↔ おすすめ接種時期(数字は接種回数)

任意 多くは有料(自己負担)。自治体によっては公費助成があります。任意接種ワクチンの必要性は定期接種ワクチンと変わりありません。 任意接種の接種できる年齢 ↔○↔ 推奨される追加接種のおすすめ時期 ※ 推奨される追加接種

 同時接種: 同時に複数のワクチンを接種することができます。安全性は単独でワクチンを接種した場合と変わりません。国や日本小児科学会も乳幼児の接種部位として太もも(大腿前外側部)も推奨しています。詳しくはかかりつけ医にご相談ください。

● 次にほかの種類のワクチンが接種できるのは、不活化ワクチンの場合1週間後の同じ曜日から、生ワクチンの場合4週間後の同じ曜日からです。